

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

180 F.

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295 - 5776

- 1 -

BULLETIN n° 58 du 6 OCTOBRE 1988

COLZA : CHARANCON du BOURGEON TERMINAL : 1ères captures.
ALTISES : peu de captures.
MALADIES : situation.
MOUCHE du CHOU : premiers symptômes.

ORGE D'HIVER : PUCERONS : risque jaunisse nanisante.

LUZERNE : CAMPAGNOLS des CHAMPS : intervenir.

COLZA

Stade 2 feuilles à 6 feuilles vraies
selon les dates de semis.

CHARANCON du BOURGEON TERMINAL

Situation :

Les premières captures en cuvette jaune
ont été enregistrées dès le 3 octobre dans
les secteurs du Tardenois (Crugny), la plaine
de Reims (Courcy) et le secteur de Suippes.

Préconisation :

Surveiller attentivement les pièges
en situations précoces. Un traitement peut
être réalisé dans les 10 à 15 jours après
les premières captures.

ALTISES

Situation :

Peu de grosses altises dans les pièges.
Dans beaucoup de situations le colza a dépassé
le stade de sensibilité des plantules aux
morsures des adultes.

Préconisation :

Ne pas intervenir sauf cas très localisés
en Haute-Marne (secteur de Bienville) où
parfois plus de 30 altises en cumul ont
été capturées. Dans ce cas, un traitement
permettra de limiter la présence de larves
dans les pétioles.

MALADIES

Situation :

Présence toujours généralisée de mildiou.
Symptômes également de phoma. Les premières
taches de pseudocercospora ont été détectées
dans le Barrois.

Préconisation :

Ne pas traiter.

MOUCHE DU CHOU

Situation :

Les premiers symptômes (galeries sur
pivot) ont été observés dans l'Aube sur
les semis précoces (secteurs d'Avalleux,
Magny-Fouchard et Villiers le Bois).

P.145

Préconisation :

Seul le microgranulé au semis permet de lutter contre ce ravageur.

ORGE D'HIVER

PUCERONS

Situation :

On assiste à l'heure actuelle à une migration des pucerons (*Rhopalosiphum padi*) du maïs vers les repousses de céréales et aux lères levées d'orge d'hiver (dans l'Aube).

D'autre part, les lères analyses de repousses de céréales et de feuilles de maïs révèlent dans certaines régions la présence de virus de la jaunisse nanisante.

Des analyses sont en cours dans notre région.

Préconisation :

Compte tenu des premières informations, il semble qu'il y ait des risques de contamination des jeunes semis en cas de vol suffisant des pucerons.

Il est donc important d'enfouir rapidement les repousses de céréales sur chaumes ou de les détruire dans les colza.

Il est encore trop tôt pour intervenir sur les lères céréales levées.

LUZERNE

CAMPAGNOL DES CHAMPS

Situation :

Les populations actuellement importantes provoquent des dégâts conséquents dans les luzernières. (cf. schéma ci-dessous).

Préconisation :

Traiter le plus tôt possible, en particuliers, les bordures et les zones où se sont réfugiés les animaux (talus - bords de fossés..).

Dans les secteurs les plus infestés, la lutte ne sera vraiment efficace que si elle repose sur une action collective.

Utiliser des appâts à base de chlorophacinone.



**LE CAMPAGNOL
DES CHAMPS**

QUEUE PLUS COURTE
QUE LA MOITIE DU
CORPS, MUSEAU ARROND
DI, OREILLES DÉPASSANT
PEU LES POILS. VENTRE
FONCÉ, MAIS PLUS CLAIR
QUE LE DOS. PATTES
COURTES : LE CAMPAGNOL
TROTTE.

(2/3 de grandeur naturelle)